





BIOLOGISCHE SPECIAALPROGRAMMA'S


KIEUWBOOGGANGEN

geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.






ONTWIKKELING EN FUNCTIE VAN DE KIEUWBOOGGANGEN: De kieuwbooggangen reiken van de voor- en achterkant van de oren via beide zijden van de nek verder in de richting van het mediastinum; wat het middelste gedeelte is van de borstholte met de longen, het hart, de slokdarm en de luchtpijp. De bekleding van de kieuwbooggangen bestaat uit plaveiselepitheel, is afkomstig van het ectoderm en wordt daarom aangestuurd vanuit de hersenschors.



OPMERKING: De kieuwbooggangen ontwikkelden zich in een tijd waarin het leven louter in de oceaan bestond. Bij vissen en amfibieën zijn ze equivalent aan de kieuwen; de ademhalingsorganen die zuurstof uit het water halen. De kieuwbooggangen stammen af van de kieuwbogen (zie ook kransslagaderen, kransadereen, aorta, halsslagaderen en ondersleutelbeenadereen die afkomstig zijn van de kieuwboogslagaderen). In het embryo geven de kieuwbogen, of branchiale bogen (het Grieske branchial = kieuw), vorm aan de structuur van het hoofd en de nek (zie ook schildklierorganen). Bij de mens ontwikkelen de kieuwbooggangen zich tijdens de vierde week van de zwangerschap.



HERSENNIVEAU: De epitheelbekleding van de kieuwbooggangen wordt aangestuurd vanuit de **pre-motorisch sensorische cortex** (deel van de hersenschors). De linker kieuwbooggangen worden vanuit de rechterkant van de hersenschors aangestuurd; de rechter kieuwbooggangen worden aangestuurd vanuit de linker hersenschors. Daarom is er een kruislings verband tussen de hersenen en het orgaan.

OPMERKING: De kieuwbooggangen en schildklierorganen delen hetzelfde hersenrelais. Het DHS beïnvloedt een van de weefsels of beide, afhankelijk van de intensiteit van het conflict.

BIOLOGISCH CONFLICT: Het biologische conflict dat verband houdt met de kieuwbooggangen is een mannelijk **frontaalangst-conflict** of een vrouwelijk **machteloos-conflict**, afhankelijk van iemands geslacht, lateraliteit en hormoonstatus (zie ook Frontaal Constellatie).

Geslacht, Lateraliteit, Hormoonstatus

Biologisch Conflict

Betroffen Orgaan

Rechtshandige man (NHS)
 Linkshandige man (NHS)
 Rechtshandige man (LTS)
 Linkshandige man (LTS)

Frontaalangst-conflict
 Frontaalangst-conflict
 Machteloos-conflict
 Machteloos-conflict

Linker kieuwbooggangen
 Rechter kieuwbooggangen*
 Rechter kieuwbooggangen
 Linker kieuwbooggangen*

Rechtshandige vrouw (NHS)
 Linkshandige vrouw (NHS)
 Rechtshandige vrouw (LOS)
 Linkshandige vrouw (LOS)


Machteloos-conflict
 Machteloos-conflict
 Frontaalangst-conflict
 Frontaalangst-conflict

Rechter kieuwbooggangen
 Linker kieuwbooggangen*
 Linker kieuwbooggangen
 Rechter kieuwbooggangen*

NHS = Normale hormoonstatus LTS = Lage testosteronstatus LOS = Lage oestrogeenstatus

***Bij linkshanders wordt het conflict overgedragen naar de andere hersenhelft**

Een frontaalangst-conflict is een grote angst om **in een gevaarlijke situatie terecht te komen of de angst voor een gevaar dat recht op iemand afkomt**. Het conflict kan in reële termen worden ervaren tijdens een frontaal ongeluk of een frontale aanval door een persoon of dier. In overdrachtelijke zin kan het naderende gevaar een dreigende confrontatie zijn, bijvoorbeeld met een overheidsinstantie of met de bank. Een frontale angst kan worden veroorzaakt door onverwacht schokkend nieuws, dat wordt gezien als een “klap in het gezicht”. Vaak wordt het conflict echter veroorzaakt door vervolgonderzoeken of de aankondiging van een medische procedure, zoals een operatie. Een van de meest voorkomende frontaalangst-conflicten is die van de confrontatie met de diagnose kanker. In GNM nemen we het conflict met betrekking tot de kieuwbooggangen dan ook een **“kankerangst-conflict”**.



Het Biologische Speciaalprogramma van de **kieuwbooggangen** volgt het **STROTSLIJMVLIES SENSIBILITEIT SCHEMA** met hyperesthesie in de conflictactieve fase en de Epileptoïde Crisis en hypesthesie in de helingsfase.

CONFLICTACTIEVE FASE: Ulceratie van de bekleding van de kieuwbooggang evenredig aan de mate en duur van de conflictactiviteit. Het **biologische doel van het celverlies** is om de gangen te verwijderen om meer zuurstof toe te laten, ook al hebben de kieuwbooggangen bij de mens geen ademhalingsfunctie meer. **Symptomen:** milde tot ernstige **pijn** in de nek.

HELIINGSFASE: Tijdens het eerste deel van de helingsfase (PCL-A) wordt het weefselverlies aangevuld door celvermeerdering met zwelling als gevolg van het oedeem (vochtophoping) in het genezingsgebied. De zwelling kan worden gediagnosticeerd als **mononucleosis** of de **ziekte van Pfeiffer** (vergelijk met mononucleosis gerelateerd aan de lymfeklieren). Of de zwelling optreedt in de kieuwbooggangen of in de lymfeklieren kan eenvoudig worden vastgesteld met behulp van een hersen-CT, die de impact van het gerelateerde conflict in het bijbehorende hersenrelais laat zien. Bovendien, als de lymfeklieren zijn betroffen is het aantal lymfocyten verhoogd, wat niet het geval is bij een genezingsproces in de kieuwbooggangen.

Een hangende genezing als gevolg van voortdurende conflictrecidieven leidt tot de ophoping van vocht in de betreffende kieuwbooggang, wat resulteert in de ontwikkeling van een **cyste** die zich **lateraal aan de rechter- of linkerzijde van het nek of in het sleutelbeengebied bevindt** (vergelijk met schildkliercysten -PCL- gelegen in het midden) of in het mediastinum waar het een **retrosternale struma** wordt genoemd. Na de Epileptoïde Crisis verdwijnt de cyste parallel aan de voltooiing van het genezingsproces. Als de helingsfase echter niet voltooid kan worden verhardt de cyste en blijft bestaan.



Een cyste in de kieuwbooggangen (in deze afbeelding aan de linkerkant van de nek) wordt vaak gediagnosticeerd als **non-Hodgkin-lymfoom**, gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de “tumor” zich ontwikkelt in de cervicale lymfeklier (zie Hodgkin’s lymfoom en non-Hodgkin lymfoom geassocieerd met lymfocytische leukemie).

In de conventionele geneeskunde heeft de embryologie geen klinische relevantie. Vandaar dat in de medische praktijk de kieuwbooggangen volledig worden genegeerd.



Deze CT-scan van de hersenen vertoont een opeenhoping van neuroglia in het controlecentrum van de linker kieuwbooggangen, wat aangeeft dat de persoon de Epileptoïde Crisis reeds is gepasseerd en zich nu in PCL-B van de helingsfase bevindt (zowel op het brein als op het orgaaniveau). In de conventionele geneeskunde wordt ten onrechte aangenomen dat de glia-opbouw een “hersentumor” is.

Aangetroffen in het mediastinum wordt een cyste in de kieuwbooggangen gediagnosticeerd als een **“kleincellig bronchiaal carcinoom”** of **“kleincellige longkanker”** (zie ook mediastinaal osteosarcoom). In het mediastinum kan een grote cyste de vitale bloedvaten comprimeren of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken als gevolg van de druk op de luchtpijp, met acute kortademigheid en happen naar adem tijdens de Epileptoïde Crisis, wanneer het vocht in de cyste wordt uitgedreven. Bij SYNDROOM, dat wil zeggen met waterretentie als gevolg van een actief bestaansconflict (diagnoseschok, ziekenhuisopname), kan de situatie kritiek worden.

OPMERKING: Alle Epileptoïde Crises die worden aangestuurd vanuit de sensorische, post-sensorische of pre-motorisch sensorische cortex gaan gepaard met een **ontregelde bloedcirculatie, duizeligheid, korte bewustzijnsstoornissen of een volledig bewustzijnsverlies** (flauwvallen of “absence”), afhankelijk van de intensiteit van het conflict. Een ander kenmerkend symptoom is een **lage bloedsuikerspiegel**, die wordt veroorzaakt door het overmatige gebruik van glucose door de hersencellen (vergelijk met hypoglykemie gerelateerd aan de eilandcellen van de alvleesklier).

Vertaling: Arjen Lievers

Bron: www.LearningGNM.com